

MEPENTOL® LECHE también ha obtenido la Marca CE clase IIb

Una vez más y siguiendo la trayectoria de Mepentol, primer producto sanitario a base de ácidos grasos hiperoxigenados que obtiene la marca CE clase IIb, ahora MEPENTOL® LECHE, miembro de la familia Mepentol, también ha conseguido la marca CE clase IIb.

Todos los productos sanitarios deben disponer obligatoriamente de la Marca CE. Además, éstos se clasifican en: clase I, clase IIa, clase IIb y II, en función de sus actividades e indicaciones. La mayoría de los productos a base de AGHO en emulsión se encuentran dentro de la clase I, e incluso alguno tiene registro de cosmético; en cambio, **MEPENTOL® LECHE es el único AGHO en emulsión con marca CE clase IIb**, es decir un producto que además de estar indicado en la prevención de las úlceras de la extremidad inferior, también puede utilizarse en el tratamiento de sus estadios iniciales.

MEPENTOL® LECHE ha conseguido también la clase IIb por su **eficacia garantizada**, gracias a los estudios publicados que avalan la efectividad del producto, y por su **garantía de calidad**, en cuanto a composición, al proceso de hiperoxigenación y al proceso de fabricación en general.

MEPENTOL® LECHE presenta así nuevas actividades como son el **favorecer la cicatrización, crear una barrera antimicrobiana** que protege la zona ulcerada de agentes externos y evitar el daño causado por un aumento de los radicales libres, gracias a su **actividad antioxidante**. Además, MEPENTOL® LECHE es el único producto en emulsión a base de AGHO que tiene **demostrada la actividad del aumento de la microcirculación sanguínea**.

Por todo ello, MEPENTOL® LECHE ahora tiene nuevas indicaciones, además de la prevención de las úlceras de la extremidad inferior, MEPENTOL® LECHE se puede utilizar también en el **tratamiento de las úlceras de la extremidad inferior en sus estadios iniciales**, entendiendo como tal las úlceras que presentan pérdida de continuidad de la piel de la epidermis o de la dermis a nivel superficial. MEPENTOL® LECHE también está indicado en la prevención de recidivas de las úlceras de la extremidad inferior y cuidado de la piel de los pacientes con insuficiencia venosa. ●

