

Esoxx One

STICK MONODOSIS

PRODUCTO SANITARIO PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO

INDICACIONES: **ESOXX ONE** es un producto sanitario de acción mecánica que permite reducir rápidamente los síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico, tales como: pirosis, dolor epigástrico, regurgitación ácida, tos irritativa, disfonía.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico, a menudo abreviada como ERGE (en inglés GERD, gastro-esophageal reflux disease), se caracteriza por síntomas (pirosis, regurgitación ácida, tos irritativa, disfonía) que pueden acompañarse de lesiones inflamatorias erosivas de la mucosa esofágica. La ERGE generalmente se ve agravada por la posición supina, por lo que los síntomas pueden empeorar durante la noche.

ESOXX ONE es una asociación original e innovadora de ácido hialurónico y sulfato de condroitina, capaz de ejercer un mecanismo de protección de la mucosa esofágica.

La presencia en la formulación de **ESOXX ONE** de un componente con alta capacidad bioadhesiva (poloxámero 407), favorece la permanencia del ácido hialurónico y el sulfato de condroitina en la superficie de la pared esofágica, contribuyendo al efecto protector contra la acción del ácido clorhídrico producido por el estómago.

El sulfato de condroitina también tiene una acción que favorece el proceso de reparación de la mucosa esofágica.

COMPOSICIÓN: Ácido hialurónico, sulfato de condroitina, polivinilpirrolidona, xilitol, benzoato de sodio, sorbato de potasio, aroma de uva, agua purificada, poloxámero 407.

ENVASE: 20 sticks (sobres monodosis) de 10 ml

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Tome un stick (sobre monodosis) después de las comidas principales y antes de acostarse, o según la recomendación de su médico. La solución puede ser bebida directamente del stick.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna en especial, salvo en casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. En este caso, interrumpa el tratamiento y póngase en contacto con su médico. Aunque no se conocen efectos secundarios, no se recomienda utilizar el producto durante el embarazo o en los primeros meses de la lactancia. En cualquier caso, consulte primero a su médico.

No se conocen interacciones con otros productos por vía oral.

ADVERTENCIAS: No exceda la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consulte a su médico. No administre el producto a niños menores de 12 años dado que no se dispone de datos clínicos con esta edad.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Consérvelo en un lugar fresco y seco y alejado de fuentes de calor. No lo congele. Manténgalo fuera del alcance y de la vista de los niños.

Fabricante: Biofarma

Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) – Italy

Distribuidor: **Alfasigma España, S.L.**

Aribau 195, 4º interior - 08021 Barcelona, España

Última revisión: diciembre 2022



0477

ALFASIGMA 

4.356.11.22
(IFU1_12/22r0_12/22)
C.00581/9